AGM "hayat bulgusu"
AGM Sağlık Görüntüleme Merkezi

PET BT (multidedektör)
Open MR (açık)
Sintigrafi
EEG - EMG
USG - EKG
Röntgen
Renkli Doppler
Kemik Dansitometri

Patient: KADIR BUGAC KUNT Patient ID: 20.10.2010

Sensory NCS

Nerve / Sites	Rec. Site	Latency ms	Peak Ampl µV	Distance cm	Velocity m/s
R MEDIAN - Digit II					
1. Wrist	II	2,90	51,9	16	55,2
L MEDIAN - Digit II					
1. Wrist	II	3,05	44,5	15,5	50,8
R ULNAR - Digit V					
1. Wrist	V	2,60	35,3	12	46,2
2. B.Elbow	V	6,60	16,5	21	52,5
3. A.Elbow	V	10,35	6,2	12	32,0
L ULNAR - Digit V					
1. Wrist	V				

Motor NCS

Nerve / Sites	Latency ms	Ampl mV	Distance cm	Velocity m/s
R MEDIAN - APB				
1. Wrist	3,60	7,2		
2. Elbow	7,50	7,1	21	53,8
R ULNAR - ADM				
1. Wrist	2,45	5,2		
2. B.Elbow	5,80	5,0	20	59,7
3. A.Elbow	9,20	3,5	12	35,3
L ULNAR - ADM				
1. Wrist	2,65	2,7		
2. B.Elbow	6,70	2,9	22	54,3
3. A.Elbow	10,25	4,3	12	33,8

KLİNİK ÖN TANI: Bilateral Ulnar sinir tuzak nöropatisi

SONUÇ: Sol ulnar sinir uyarımında 5. parmaktan DSAP(duysal sinir aksiyon potansiyel) elde edilemedi, dirsek seviyesi motor ileti hızı düşüktür.

Sağ ulnar duyu-motor ileti hızı dirsek seviyesinde düşüktür. Duyu iletimi bilek seviyesinde de düşük olarak saptandı

Bilateral medıan sinirler normaldir.

Bu elektrofizyolojik bulgular BİLATERAL ULNAR SİNİR DİRSEK SEVİYESİ TUZAK NÖROPATİSİ(SOLDA DAHA BELİRGİN BİLATERAL ORTA DERECEDE)ile uyumludur.

Solda duysal DSAP elde edilemedi, sağda bilekte de düşük ileti hızı mevcut. Duysal liflerin ağır derecede etkilendiğini göstermektedir. Dereceleme motor liflere göre yapılmıştır.

Dr Turgay GÜL
Nöroloji Uzmanı